

認 識 毒 品

講授人 許震宇 老師

sophist@nuk.edu.tw

國立高雄大學通識教育中心

什麼是毒品！？

醫療與濫用之間

戒斷現象

連續每天吸食物質數星期後突然停止後所產生的不舒服症狀，同時又渴望要吸食

憂鬱

噁心,嘔吐

肌肉骨骼酸痛

流淚,流鼻涕

畏光,盜汗,起雞皮疙瘩

腹瀉

打呵欠,失眠

發燒

染毒後的初期症狀

一、徹夜失眠。

二、食慾變差。

三、體重減輕。

四、老是打呵欠沒精神。

五、老是流鼻水、流眼淚、噁心、嘔吐。

六、情緒起伏不定，焦慮不安。

七、猜忌多疑。

八、獨鎖房門。

九、瞳孔縮小。

藥物濫用者行為表徵

◎ 情緒方面

- 多話、躁動不安、沮喪、好辯

◎ 身體方面

- 思睡、食慾不振、目光呆滯
- 結膜紅腫、步履不穩、靜脈炎

◎ 感官表達方面

- 視幻、聽幻、無方向感

◎ 社會適應方面

- 多疑、誇大、好鬥、無理性行為、缺乏動機

◎毒品危害之共同特徵

1. 欣快感-心理依賴性
2. 耐藥性-迅速增量造成急性中毒
3. 戒斷症候群-生理依賴性
4. 社會危害性-社會成本高昂

毒品分類

依習慣性、依賴性、濫用性、對社會危害性
分4級管理。

◎毒品之分類

毒品種類：

(一)麻醉藥品：

1.鴉片類：嗎啡、海洛因、配西汀、美沙
酮、可待因等

2.古柯類：古柯鹼、快克等

3.大麻類：大麻脂、大麻煙等

(二)影響精神物質：

1.迷幻劑類：LSD、THC、PCP等

2.興奮劑類：安非他命等

3.抑制劑類：紅中、青發、白板、FM2等

嬰
蛋

西
栗



鴉片



嗎啡



海洛因



海洛因





海洛因磚

古柯鹼



速錫康



大麻



大麻煙



大麻脂



安非他命



MDMA



白板



LSD



1111 P St

100 George Ave

Washington, D.C.



一粒沙



搖腳丸



紅中、青發

安眠鎮靜劑



來源：屬巴比妥酸鹽製劑。



青發紅中

性狀：白色帶苦味無氣味粉末，抑制神經中樞，紅中〔主成分：secobarbital〕為紅色膠囊。

青發〔主成分：amobarbital〕為青色膠囊。



FM2



強力膠



如何防制？ ？ ？



藥物濫用(毒品) 防制策略

減少供應(Supply Reduction)



減少需求(Demand Reduction)



減少傷害(Harm Reduction)



拒毒

減少需求(Demand Reduction)

- 落實拒毒宣導
- 拒絕毒品誘惑



如何提高警覺避免受害？

1. 遠離是非場所: 電動玩具店, KTV, PUB, 撞球, 舞廳
2. 提高警覺不隨便接受陌生人的飲料、香菸, 儘可能點有蓋飲料。
3. 特別小心朋友的朋友。
4. 把握時間: FM2服用後約20~30分鐘產生作用, 若放入酒內更快。如發現有異立刻衝出去、離開現場向鄰居求救。

處罰規定

- 1.製造、運輸、販賣第一級毒品，處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科新台幣一千萬元以下罰金。
- 2.製造、運輸、販賣第二級毒品，處無期徒刑得併科新台幣七百萬元以下罰金。
- 3.施用毒品者，依規定為不起訴之處分或不付審理之裁定後，五年內再犯第十條之罪，經觀察、勒戒後，認為有繼續施用毒品之傾向或三犯以上者，依法處分。施用第一級毒品者，處六個月以上五年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。

結

論

如何向毒品說不:

- (1). 避免或延遲與煙、酒、檳榔、藥物的接觸 (戒煙、戒酒、拒絕吃檳榔)
- (2). 及早提供濫用物質對身體傷害的知識及相關的法令規章
- (3). 協助戒除吸煙、飲酒或吃檳榔的習慣
- (4). 教學正常化
- (5). 強化休閒設施及活動

拒 絕 毒 品 的 方 法

拒絕不良嗜好

建立紓緩壓力、情緒的正當方法

建立正確用藥觀念

遠離是非場所

提高警覺不隨便接受陌生人之飲料、香煙

培養健康正當休閒活動

建立自信及自尊心戒煙