

親愛的同學 

在接種疫苗前詳閱注意事項做好準備，幫助自己順利度過接種疫苗後的不適。**接種完請一定要好好休息、避免獨處，隨時注意身體狀況喔！**

接種前

1. 確認接種時間、地點，在外全程做好防護措施
2. 備妥健保卡
3. 避免熬夜、空腹

接種後

1. 壓住接種部位止血1-2分鐘。
2. 打完針記得不要揉，可以適當冰敷，每次5分鐘，1天3-4次，小心別凍傷皮膚。
3. 留觀30分鐘，沒有身體不適再回家。
4. 接種後72小時：定時量體溫、多喝水、多休息，要有人陪伴及照顧，避免獨處。
5. 避免劇烈運動或體力活動
6. 接種疫苗後，如有不良反應，可向學校申請至多3天疫苗假(含接種當日)

接種後需要就醫的情況!!


1. 嚴重過敏反應：呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速、全身紅疹。
2. 超過72小時發燒不退
3. 接種部位產生膿瘍
4. 其他預期外的不適

疫苗保護力並非100%，因此即使完成疫苗接種，仍應勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險唷!

學務處衛保組關心您

COVID-19 疫苗接種

注意事項看這邊



接種疫苗前



- 1 對疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前疫苗劑次發生嚴重過敏反應者，不可接種
- 2 不可與其他疫苗同時接種，或與其他廠牌交替使用
- 3 發燒或正患有急性中重度疾病者，請等到病情穩定後再接種
- 4 服用避孕藥或接受荷爾蒙治療者，請先暫緩接種
- 5 免疫功能低下者(含接受免疫抑制劑治療者)，免疫反應可能減弱



接種疫苗後



- 1 接種後於接種單位或附近休息30分鐘再離開
- 2 使用抗血小板/抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後請於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否有出血或血腫情形
- 3 接種後可能發生接種部位疼痛、紅腫，或是疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心等反應，通常輕微並於數天內消失
- 4 接種後可能有發燒反應($\geq 38^{\circ}\text{C}$)，約48小時可緩解，如持續發燒超過48小時或出現其他嚴重過敏反應，應儘速就醫，並告知醫師曾接種疫苗，同時請醫師通報
- 5 接種後14天內若有呼吸困難、胸/腹痛、四肢腫脹/冰冷、嚴重頭痛等不舒服症狀，應立即就醫